

Plan de traitement Mouche de la cerises et suzukii	Adapter les dates aux conditions locales et aux dates de récoltes effectives				
	Parcelles avec filets	Parcelles sans filets		Toutes les parcelles	
	"Sécurisation"	Pression moyenne a faible	Pression forte	Très forte pression	
Semaine 1-2 (Burlat, etc)	(1) ou (2) à la fermeture des filets	Récolte: 6-7 juin		Idem "pression forte" + Avant la récolte: Parexan N, Pyrethrum FS, Sepal (3 jours) Entre les passages récolte: Parexan N, Pyrethrum FS, Sepal (3 jours) ou Audienz, Spintor (7 jours)	
Applications		(2) 30-31 mai			
Semaine 3 (Merchant, Giorgia, etc)		Récolte: 19-20 juin			
Applications		(2) 9-12 juin	(2) 12-13 juin		(1) 5-6 juin et (2) 12-13 juin ou (3) 12-13 juin
Semaine 4 (Grace Star, Summit, etc)		Récolte: 25-26 juin			
Applications		(2) 15-18 juin	(1) 4-5 juin et (2) 18-19 juin		(2) 18-19 juin ou (3) 18-19 juin
Semaine 5 (Kordia, etc)		Récolte: 2-3 juillet			
Applications		(2) 22-25 juin	(1) 10-11 juin et (2) 25-26 juin		(1) 4-5 juin et (1) 18-19 juin et (3) 25-26 juin
Semaine 6 (Regina, etc)		Récolte: 9-10 juillet			
Applications		(2) 29-2 juillet	(1) 17-18 juin et (2) 2-3 juillet		(1) 11-12 juin et (1) 25-26 juin et (3) 2-3 juillet
Semaine 7 (Sweetheart, etc)		Récolte: 16-17 juillet			
Applications		(2) 6-9 juillet	(1) 24-25 juin et (2) 9-10 juillet		(1) 18-19 juin et (1) 2-3 juillet et (3) 9-10 juillet

(1) En vert: Alanto, Movento SC (14 jours)

(2) En bleu : Gazelle, Oryx Pro (7 jours)

(3) En rouge: Audienz, Spintor (7 jours)

L'utilisation de produits ou de procédés mentionnés dans ce bulletin n'engage d'aucune manière la responsabilité de l'Ufi. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l'étiquette.