

	Stades	Maladies et ravageurs principaux	Autres éléments à prendre en compte
Préfloral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dépérissement bactérien (<i>Pseudomonas sp.</i>)</b> : ne pas tailler en période de repos, attendre la reprise de végétation. Favoriser quand c'est possible le cuivre pour les premières applications fongique avant le début de la floraison.</li> <li>• <b>Monilioses</b> : supprimer les momies lors de la taille.</li> <li>• <b>Maladie criblée</b> : positionner la première application au stade (C)-D en préventif lors de durée d'humectation foliaire de plus de 24h.</li> </ul>		
	<b>C (53)</b> « Eclatement des bourgeons »	<b>Maladie criblée</b> : en cas d'infection importante les années précédente débiter la lutte au stade C.	<b>Cochenille blanche du mûrier</b> : <i>Huile de paraffine 56/ha</i>
	<b>D (57)</b>  « Ouverture des sépales »	<b>Pucerons noirs du cerisier</b> : <i>Huile de paraffine 32l/ha</i> aussi efficace contre les acariens rouges et les cheimatobies. <b>Maladie criblée</b> : <i>Cuivre 300-400 g de Cu métal /ha, Soufre mouillable 5kg/ha, Mycosin 8kg/ha, Captan, Dithianon, Folpet</i>	
	<b>E (59)</b>  « Ballonnets »	<b>Monilioses</b> : <i>Armcarb 5kg/ha</i> <i>Voir la liste spécifique des fongicides fruits à noyau</i> Réaliser la première application contre la moniliose sur fleurs si les conditions sont favorables.	<b>Capua, cheimatobies, noctuelles</b> : <i>Delfin, Dipel Steward</i>
Floraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Monilioses</b> : première période « à risque » durant la floraison. Répéter les applications durant toute la floraison lors d'humidité relative de plus 70-80% (brouillard, précipitations, orages, etc) et avec des durées d'humectations de plus de 24h, tous les 7-10 jours.</li> <li>• <b>Maladie criblée</b> : continuer la lutte en combinant les applications avec celle contre les monilioses.</li> </ul>		
	<b>F (61)</b> « Début de floraison »	<b>Pas d'insecticide durant la floraison</b>  <b>Moniliose des fleurs</b> : <i>Armcarb 5kg/ha</i> <i>Voir la liste spécifique des fongicides fruits à noyau</i>  <b>Maladie criblée</b> : <i>Soufre 5kg/ha, Mycosin 8kg/ha</i> <i>Voir la liste spécifique des fongicides fruits à noyau</i>	
	<b>F (65)</b> « Pleine floraison »		
	<b>(69)</b>  <b>Fin de floraison</b>		
		La fermeture des protections pluies durant la floraison limite le risque d'infection des monilioses et de la maladie criblée.	

L'utilisation de produits ou de procédés mentionnés dans ce bulletin n'engage d'aucune manière la responsabilité de l'Ufl. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l'étiquette.

	Stades	Maladies et ravageurs principaux	Autres éléments à prendre en compte
<b>Développement des fruits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pucerons noirs</b> : contrôle et intervention après la floraison.</li> <li><b>Maladie criblée</b> : continuer la lutte en préventif sur les durées d'humectation de plus de 36h jusqu'à la fermeture des protection pluie sur les vergers avec des symptômes visibles.</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;"><b>H (71)</b></p>  <p style="text-align: center;">« Nouaison »</p>	<p><b>Pucerons noirs</b> :</p> <p><i>Neem-Azal</i> <i>Pirimor, Movento (Ne pas utiliser Alanto et Gazelle)</i></p> <p>Si faible pression (Seuil 5% des pousses attaquées), attendre la fermeture des filets.</p>	<p><b>Capua, cheimatobies, noctuelles</b> :</p> <p><i>Delfin, Dipel</i> <i>Steward</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>I-J (73)</b></p> <p style="text-align: center;">« Jeune fruit »</p>	<p><b>Maladie criblée</b> :</p> <p><i>Soufre mouillable 5kg/ha, Mycosin 8kg/ha</i> <i>Captan, Dithianon, Folpet</i></p>	<p><b>Pourriture amère</b> :</p> <p>à prendre en compte sur les parcelles avec historique lors de temps chaud et humide entre la fin de la floraison et le début de récolte.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>(75-77)</b></p>  <p style="text-align: center;">« Croissance des fruits »</p>	<p><b>Mouche de la cerise et Suzukii</b> :</p> <p><i>Fermeture des couvertures et des filets selon les avertissements (env. 15 mai).</i></p> <p><b>Suzukii et pucerons noirs</b> :</p> <p><i>Alanto, Gazelle à la fermeture des filets</i></p> <p>Pose de piège attractif pour la Suzukii et Rebel amarillo pour la mouche de la cerise.</p>	<p><i>Captan, Dithianon, Folpet</i> <i>et voir la liste spécifique des fongicides fruits à noyau.</i></p>
<b>Maturation des fruits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Suzukii et mouche de la cerise</b> : Voir les dates d'intervention selon les avertissements du bulletin Ufl</li> <li><b>Monilioses</b> : Début de la deuxième période « à risque ». Intervenir lors des périodes de fort grossissement des fruits. En général 3-4 semaines avant la récolte</li> </ul>		
	<p style="text-align: center;"><b>(81)</b></p>  <p style="text-align: center;">« Début de coloration »</p>	<p><b>Moniliose des fruits</b> :</p> <p><i>Pas de solution de lutte directe en bio</i> <i>Voir la liste spécifique des fongicides fruits à noyau, attention aux délais d'attente.</i></p> <p>Une première application à la fermeture des filets ou un mois avant la récolte répétée 10 ou 15 jours avant la récolte. Avec les couvertures anti pluie on peut renoncer la deuxième application lors de conditions favorables (HR&lt;70% et variétés tolérantes).</p>	<p><b>Pourriture amère</b> :</p> <p>Idem ci-dessus</p>
	<p style="text-align: center;"><b>(87-89)</b></p> <p style="text-align: center;">« Récolte »</p>		<p><b>Acariens</b> :</p> <p><i>Introduction d'auxiliaire</i></p>
<b>Post-récolte</b>	« Été »	<p><b>Acariens</b> :</p> <p>En cas de remontée en fin de récolte, ouvrir rapidement les filets et les couvertures anti-pluie</p> <p><i>Natural, Siva (1000l/ha et concentration maximum de 2%) réaliser lors d'une journée ensoleillée</i> <i>Kiron, Zénar (max une application par année, possible après le 30 juin)</i></p>	
	« Automne »	<p><b>Chancre bactérien</b> :</p> <p><i>Cuivre à la chute des feuilles, 1-2 applications avec 300-400g de Cu métal/ha</i></p>	

L'utilisation de produits ou de procédés mentionnés dans ce bulletin n'engage d'aucune manière la responsabilité de l'Ufl. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l'étiquette.